

**Literaturverzeichnis zum Titelthema “Neues aus der Psychiatrie”**

**Bayerisches Ärzteblatt 9/2009, Seite 392 ff.**

**Professor Dr. Dipl.-Psych. Gerd Laux**

1. Albrecht M, Fürstenberg T, Gottberg A. Strukturen und Finanzierung der neurologischen und psychiatrischen Versorgung. Berlin: IGES; 2007.
2. Barbui C, Esposito E, Cipriani A. Selective serotonin reuptake inhibitors and risk of suicide: a systematic review of observational studies. *CMAJ* 2009;180:291-297.
3. Bauer M, Bschor T, Pfennig A, et al. Biologische Behandlung unipolarer depressiver Störungen in der allgemeinärztlichen Versorgung. Leitlinien der World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP). *Psychopharmakotherapie* 2008;15:239-264.
4. Cipriani A, Furukawa T, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multi-treatments meta-analysis. *Lancet* 2009;373:746-758.
5. Deutscher Bundestag. Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung: Hirnforschung; 2008. Report No.: Drucksache 16/7821.
6. DGPPN, DGPM, DKPM, DGP, DGKJP. S2 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Band 1 Behandlungsleitlinie Persönlichkeitsstörungen. Darmstadt: Steinkopff; 2009.
7. Fichter M, Kohlboeck G, Quadflieg N. The Upper Bavarian longitudinal community study 1975-2004. Long-term course and outcome of depression. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 2008;258:476-488.
8. Geddes J, Carney S, Davies C, et al. Relapse prevention with antidepressant drug treatment in depressive disorders: a systematic review. *Lancet* 2003;361:653-661.
9. Gibbons RD, Brown CH, Hur K et al. Relationship between antidepressants and suicide attempts. An analysis of the Veterans Health Administration data sets. *Am J Psychiatry* 2007;164:1044-1049.
10. Grüsser S, Poppelreuter S, Heinz A, et al. Verhaltenssucht. *Nervenarzt* 2007;78:997-1002.
11. Hochstrasser B, von Bardeleben U, Ruckstuhl L, et al. Therapie des Burnout. *Nervenheilk* 2008;27:11-24.
12. Holsboer F. How can we realize the promise of personalized antidepressant medicines? *Nature Reviews Neuroscience* 2008;9:638-646.
13. IQWiG -A05-19A Cholinesterasehemmer bei Alzheimer Demenz.  
<http://www.iqwig.de/index.403.html>
14. Jong-Meyer R de, Hautzinger M, Kühner C, et al. Evidenzbasierte Leitlinie zur Psychotherapie Affektiver Störungen. Göttingen: Hogrefe; 2007.
15. Kalus P, Falkai P, Heinz A. Strukturelle und funktionelle Veränderungen bei schizophrenen Psychosen. Hinweis auf eine frühe neuronale Entwicklungsstörung? *Nervenarzt* 2008;79:275-287.
16. Kapfhammer HP. Konzepte zur Psychotherapie der akuten und posttraumatischen Belastungsstörung. *Nervenheilk* 2008;27:28-39.
17. Kirsch I, Deacon B, Huedo-Medina T, et al. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. *PLoS Med* 2008;5(e45).
18. Laux G. Affektive Störungen. In: Möller HJ, Laux G, Kapfhammer HP (Hrsg) *Psychiatrie und Psychotherapie*. 3. Aufl. Band 2 Spezielle Psychiatrie. Springer, Berlin 2008
19. Laux G, Artmann S, Günther W, et al. Verordnungsgewohnheiten von Psychopharmaka an deutschen psychiatrischen Krankenhäusern. Ergebnisse einer Befragung der Bundesdirektorenkonferenz. Teil III: Antidepressiva. *Psychopharmakotherapie* 2008;15:265-271.
20. Laux G, Möller HJ (Hrsg). Agomelatin - ein neuer Ansatz in der Behandlung depressiver Störungen. *Psychopharmakotherapie* 2009;16(Suppl 19):1-20.

21. Leucht S, Corves C, Arbter D et al. Second-generation versus first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia: a meta-analysis. Lancet 2009; 373: 31-41
22. Maercker A, Forstmeier S, Wagner B, et al. Posttraumatische Belastungsstörungen in Deutschland. Ergebnisse einer gesamtdeutschen epidemiologischen Untersuchung. Nervenarzt 2008;79:577-586.
23. Maier W, Möller HJ. Metaanalysen. Methoden zur Evidenzmaximierung von Therapiestudien. Nervenarzt 2007;78:1028-1036.
24. Mann K, Loeber S, Croissant B, et al. Qualifizierte Entzugsbehandlung von Alkoholabhängigen: Ein Manual zur Pharmako- und Psychotherapie. Köln: DÄV; 2006.
25. Melchinger H. Umsteuerungen dringend geboten. Dtsch Ärztebl 2008;105:A2457-60.
26. Möller HJ, Baldwin D, Goodwin G, et al. Do SSRIs or antidepressants in general increase suicidality? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2008;258(Suppl 3):3-23.
27. Möller HJ, Laux G, Deister A. Psychiatrie und Psychotherapie. Duale Reihe. 4.Auflage. Thieme, Stuttgart 2009
28. Mössner R, Maier W, Rujescu D. Neue Erkenntnisse zur Genetik der Schizophrenie. Nervenarzt 2009;80:6-11.
29. Renner T, Gerlach M, Romanos M, et al. Neurobiologie des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms. Nervenarzt 2008;79:771-781.
30. Rush AJ, Kraemer H, Sackeim H, et al. Report by the ACNP Task Force on response and remission in major depressive disorder. Neuropsychopharmacology 2006;31:1841-1853.
31. Rush AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, Nierenberg AA et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR\*D report. Am J Psychiatry 2006; 163: 1905-1917.
32. Schmidt L, Gastpar M, Falkai P, et al. Evidenzbasierte Suchtmedizin - Behandlungsleitlinie Substanzbezogene Störungen. Köln: DÄV; 2006.
33. Schoepf D, Konradt B, Walter H. Spezifische Psychotherapie der chronischen Depression mit dem Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. Nervenheilk 2007;26:790-802.
34. Schwabe U, Paffrath D (Hrsg) Arzneiverordnungs-Report 2008. Springer, Heidelberg 2009
35. Steunenberg B, Braam A, Beekman A, et al. Evidence for an association of the big five personality factors with recurrence of depressive symptoms in later life. Int J Geriatric Psychiatry 2009;30:100-108.
36. Stolk P, Ten Berg M, Hemels M, et al. Meta-analysis of placebo rates in major depressive disorder trials. Ann Pharmacother 2003;37:1891-1899.
37. Trivedi M, Rush AJ, Wisniewski S, et al. Evaluation of outcomes with citalopram for depression using measurement-based care in STAR\*D: implications for clinical practice. Am J Psychiatry 2006;163:28-40.
38. Wolfersdorf M, Küthmann A. Psychotherapie/Psychosomatik in den bayerischen Bezirkskrankenhäusern - Ergebnisse der Umfrage Stand 2006. Psychotherapie 2008;13:141-145.
39. Wolter D. Risiken von Antipsychotika im Alter, speziell bei Demenzen. Eine Übersicht. Z Gerontopsychol Psychiatr 2009;22:17-56.