

Literaturverzeichnis

zum Titelthema „Neues aus der Palliativmedizin“

Bayerisches Ärzteblatt 11/2012, Seite xxx ff.

von Constanze Rémi, M. Sc., Fachapothekerin und Dr. Elisabeth Albrecht

1. Portenoy K and Hagen N (1990) Breakthrough pain: definition, prevalence and characteristics. *Pain*. **41**: 273–281.
2. Mercadante S *et al.* (2002) Episodic (breakthrough) pain: consensus conference of an expert working group of the EAPC. *Cancer*. **94**: 832–839.
3. Davis MP *et al.* (2005) Controversies in pharmacotherapy of pain management. *Lancet Oncology*. **6**: 696–704.
4. Davis MP (2003) Guidelines for breakthrough pain dosing. *American Journal of Hospice and Palliative Care*. **20**: 334.
5. Frampton JE (2010) Tapentadol immediate release: a review of its use in the treatment of moderate to severe acute pain. *Drugs*. **70**: 1719-1743.
6. Lange B *et al.* (2010) Efficacy and safety of tapentadol prolonged release for chronic osteoarthritis pain and low back pain. DOI 10.1007/s12325-010-0086-6. *Advances in Therapy*. **27**: 381-399.
7. Abernethy AP *et al.* (2010) Effect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with refractory dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial. *Lancet*. **376**: 784-793.
8. Currow DC *et al.* (2011) Once-daily opioids for chronic dyspnea: a dose increment and pharmacovigilance study. *J Pain Symptom Manage*. **42**: 388-399.
9. StMUG and StMAS Begleitung und Versorgung Schwerstkranker und Sterbender sowie ihrer Angehörigen in Bayern - Rahmenkonzept zur Hospiz- und Palliativversorgung.
http://wwwstmugbayernde/gesundheit/krankenhaus/palliativstationen/pall_rahmenkonzept.htm: StMUG, StMAS; 2011.
10. Temel JS *et al.* (2010) Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med*. **363**: 733-742.