

**Literaturverzeichnis zum Variabeitrag „Es ist nie zu früh – Prävention und Frühintervention im Rahmen „Früher Hilfen“ am Beispiel der Koordinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) in der Nordoberpfalz“
von Dr. Markus Wittmann und Marianne Fütterer**

Bayerisches Ärzteblatt 1-2/2022, Seite 36 ff.

- (1) Koordinierende Kinderschutzstelle Nordoberpfalz; Internetlink: <https://www.neustadt.de/familie-bildung/koki-netzwerk-fruehe-kindheit/wir-ueber-uns/koki-nordoberpfalz/>; zuletzt abgerufen am: 03.10.2020#
- (2) Frühe Hilfen – Begriffsbestimmung; Internetlink: <https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehenhilfen/fruehe-hilfen-begriffsbestimmung/>; zuletzt aufgerufen am: 03.10.2020
- (3) Datenreport Frühe Hilfen. Ausgabe 2017; Internetlink: https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Publikation-NZFH-Datenreport-Fruehe-Hilfen-2017.pdf; zuletzt abgerufen am: 03.10.2020
- (4) Eickhorst, A., Brand, C., Lang, K. et al. Die Prävalenzstudie „Kinder in Deutschland – KiD 0-3“ zur Erfassung von psychosozialen Belastungen und Frühen Hilfen in Familien mit 0-3-jährigen Kindern: Studiendesign und Analysepotential. *Soz Passagen* 7, 381–387 (2015). <https://doi.org/10.1007/s12592-015-0212-z>
- (5) Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) § 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung; Internetlink: https://www.gesetze-im-internet.de/kkg/_1.html, zuletzt abgerufen am 03.10.2020
- (6) Richtlinie zur Förderung Koordinierender Kinderschutzstellen KoKi – Netzwerk frühe Kindheit; Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration vom 5. Januar 2017, Az. II 5/6523.01-1/23; Internetlink: https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/images/stmas/stmas_inet/kinderschutz/3.7.3.2_forderrichtlinie_koki.pdf; zuletzt abgerufen am: 03.10.2020
- (7) Mongan D, Lynch J, Hanna D, et al. Prevalence of self-reported mental disorders in pregnancy and associations with adverse neonatal outcomes: a population-based cross-sectional study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2019;19(1):412. Published 2019 Nov 8. doi:10.1186/s12884-019-2572-4
- (8) Kelly R, Zatzick D, Anders T. The detection and treatment of psychiatric disorders and substance use among pregnant women cared for in obstetrics. *Am J Psychiatry*. 2001;158(2):213-219. doi:10.1176/appi.ajp.158.2.213
- (9) Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *Br J Psychiatry*. 1987;150:782-786. doi:10.1192/bjp.150.6.782
- (10) Die Edinburgh Postnatale Depression Skala (EPDS) EPDS Richtlinie für Professionelle im Gesundheitswesen; Internetlink: <http://s522812237.online.de/wp-content/uploads/2015/04/FolieEPDS.pdf>; zuletzt abgerufen am 03.10.2020
- (11) Martini, J., Einbock, K., Wintermann, G.-B., Klotsche, J., Junge-Hoffmeister, J. & Hoyer, J. (2009). Die Depression-Angst-Stress-Skala für die Peripartalzeit: Ein Screeninginstrument für die Schwangerschaft und das Wochenbett. *Klinische Diagnostik und Evaluation*, 4(2), 288-309.
- (12) Brockington I. Diagnosis and management of post-partum disorders: a review. *World Psychiatry*. 2004;3(2):89-95.

- (13) PBQ: Eltern-Kind-Beziehungsfragebogen; Internetlink: <http://s522812237.online.de/wp-content/uploads/2015/04/FoliePBQ.pdf>, zuletzt abgerufen am: 03.10.2020
- (14) Hübner-Liebermann B, Hausner H, Wittmann M. Recognizing and treating peripartum depression. Dtsch Arztebl Int. 2012;109(24):419-424. doi:10.3238/arztebl.2012.0419
- (15) Webseite der „Aktion Lichtblicke“; Internetlink: <https://lichtblicke.de/>; zuletzt aufgerufen am 03.10.2020
- (16) Koordinierende Kinderschutzstelle Nordoberpfalz; Internetlink: <https://www.neustadt.de/familie-bildung/koki-netzwerk-fruehe-kindheit/wir-ueber-uns/koki-nordoberpfalz/>; zuletzt abgerufen am: 03.10.2020
- (17) Filsinger, B. LupE: Screening auf psychosoziale Belastungsfaktoren in der Geburtshilfe. Pflegez 70, 10–13 (2017). <https://doi.org/10.1007/s41906-017-0047-7>